



Catálogo semillas




Bienvenido al catálogo de productos



Accedé a todos los productos de nuestro portafolio de manera rápida y precisa, con la información justa para que encuentres el producto que mejor se adapta a tus necesidades.




MAÍZ⁰⁵
SOYA⁰⁶
GIRASOL⁰⁸



MAIZ



NS 70



● Zona óptima ● Zona de adaptación


Invierno Marzo a Mayo		Verano Octubre a Diciembre					
Invierno 52.000 A 55.000		Verano 50.000 A 52.000					
B	MB	MA	A	B	MB	MA	A
Convencional							
152 - 135							
Semi - dentado Anaranjado							
64				58			
352							
Helminthosporium ● Puccinia Polysora ● Espiroplasmosis ● Geen Snap ● Quebrado ● Vuelco ●							
210 - 120							
B	MB		MA		A		
Bajo < 3.000	Medio Bajo 3.000-4.000		Medio Alto 4.000-6.000		Alto > 6.000		

● Tolerante ● Moderadamente tolerante ● Intermedio
● Moderadamente susceptible ● Susceptible R Resistente

● Excelente ● Muy bueno ● Bueno
● Regular ● Malo



NS 82



● Zona óptima ● Zona de adaptación

Invierno Marzo a Abril		Verano 15 de septiembre a 15 de diciembre					
Invierno 52.000 A 55.000		Verano 50.000 A 52.000					
B	MB	MA	A	B	MB	MA	A
Convencional							
143- 133							
Semi - duro Anaranjado							
60				54			
345							
Helminthosporium Puccinia Polysora Espiroplasmosis Geen Snap Quebrado Vuelco 							
220 - 130							
B	MB		MA		A		
Bajo < 3.000		Medio Bajo 3.000-4.000		Medio Alto 4.000-6.000		Alto > 6.000	


● Tolerante ● Moderadamente t olerante ● Intermedia
● Moderadamente susceptible ● Susceptible R Resistente

● Excelente ● Muy bueno ● Bueno
● Regular ● Malo

SOYA



NS 7809 Magnífica



RR1

	NORTE	CENTRO	ESTE	SUR
BAJO				
MEDIO			○	○
ALTO	○	○	○	○

VII Largo

Indeterminado

Días a R1	34	Días a R8	112
-----------	----	-----------	-----

Púrpura

Gris

180


95

○ Alto ● Medio ● Bajo

○ Alto ● Medio ● Bajo

○ Excelente ● Muy bueno ● Bueno
● Regular ● Malo

● Cercospora Kikuchii ● Antracnosis
● Phytophthora Sojae ● Mancha anillada




NORTE	BAJO	<1.500	ESTE	BAJO	<1.500
	MEDIO	1.500-2.500		MEDIO	1.000-3.000
	ALTO	>2.500		ALTO	>3.000
CENTRO	BAJO	<1.500	SUR	BAJO	<2.000
	MEDIO	1.500-3.000		MEDIO	2.000-3.000
	ALTO	>3.000		ALTO	>3.000

● Recomendado ● Medianamente recomendado ● No recomendado
● Tolerante ● Moderadamente tolerante ● Intermedio
● Moderadamente susceptible ● Susceptible ● Resistente



NS 8288 STS Rubí



RR1 STS

	NORTE	CENTRO	ESTE	SUR
BAJO				
MEDIO		○	○	○
ALTO		○	○	○

VIII Medio

Determinado

Días a R1	37	Días a R8	120
-----------	----	-----------	-----

Púrpura

Castaño

200


70

● Alto ● Medio ● Bajo

● Alto ● Medio ● Bajo

○ Excelente ● Muy bueno ● Bueno
● Regular ● Malo

● Cercospora Kikuchii ● Antracnosis
● Phytophthora Sojae ● Mancha anillada




NORTE	BAJO	<1.500	ESTE	BAJO	<1.500
	MEDIO	1.500-2.500		MEDIO	1.000-3.000
	ALTO	>2.500		ALTO	>3.000
CENTRO	BAJO	<1.500	SUR	BAJO	<2.000
	MEDIO	1.500-3.000		MEDIO	2.000-3.000
	ALTO	>3.000		ALTO	>3.000

● Recomendado ● Medianamente recomendado ● No recomendado
● Tolerante ● Moderadamente tolerante ● Intermedio
● Moderadamente susceptible ● Susceptible ● Resistente



NS 7901 Fortaleza



RR1

	NORTE	CENTRO	ESTE	SUR
BAJO				
MEDIO	○			
ALTO	○	○	○	

VII Largo

Indeterminado

Días a R1	38	Días a R8	120
-----------	----	-----------	-----

Blanca

Castaño

140


100

○ Alto ● Medio ● Bajo

○ Alto ● Medio ● Bajo

● Excelente ● Muy bueno ○ Bueno
● Regular ● Malo

● Cercospora Kikuchii ● Antracnosis
● Phytophthora Sojae ● Mancha anillada




NORTE	BAJO	<1.500	ESTE	BAJO	<1.500
	MEDIO	1.500-2.500		MEDIO	1.000-3.000
	ALTO	>2.500		ALTO	>3.000
CENTRO	BAJO	<1.500	SUR	BAJO	<2.000
	MEDIO	1.500-3.000		MEDIO	2.000-3.000
	ALTO	>3.000		ALTO	>3.000

● Recomendado ● Medianamente recomendado ● No recomendado
● Tolerante ● Moderadamente tolerante ● Intermedio
● Moderadamente susceptible ● Susceptible ● Resistente



NA 8015



RR1

	NORTE	CENTRO	ESTE	SUR
BAJO	○	○	○	
MEDIO	○	○	○	
ALTO	○			

VIII Corto

Indeterminado

Días a R1	42	Días a R8	125
-----------	----	-----------	-----

Blanca

Castaño

160


110

● Alto ● Medio ● Bajo

○ Alto ● Medio ● Bajo

○ Excelente ● Muy bueno ● Bueno
● Regular ● Malo

● Cercospora Kikuchii ● Antracnosis
R Phytophthora Sojae ● Mancha anillada



NORTE	BAJO	<1.500	ESTE	BAJO	<1.500
	MEDIO	1.500-2.500		MEDIO	1.000-3.000
	ALTO	>2.500		ALTO	>3.000
CENTRO	BAJO	<1.500	SUR	BAJO	<2.000
	MEDIO	1.500-3.000		MEDIO	2.000-3.000
	ALTO	>3.000		ALTO	>3.000

● Recomendado ● Medianamente recomendado ● No recomendado
● Tolerante ● Moderadamente tolerante ● Intermedio
● Moderadamente susceptible ● Susceptible ● Resistente

Tecnología

Ambiente recomendado

Grupo de madurez

Hábito de crecimiento

Siembra

Color de flor

Pubescencia

P 1.000 Granos (gramos)*

Altura (cm)*

Ramificación*

Porte

Comportamiento a vuelco

Perfil sanitario y agronómico

Épocas de siembra por zona

Posicionamiento agronómico

GIRASOL

- Tecnología
- Ambiente recomendado
- Ciclo
- Días de floración
- Días a madurez fisiológica
- % de aceite
- Capítulo
- Comportamiento frente a Vuelco de raíz
- Perfil sanitario
- Población recomendada
- Épocas de siembra por zona
- Posicionamiento agronómico

✓

PARAÍSO 1600 CLP

● Zona óptima

● Zona de adaptación

Clearfield Plus

B

MB

MA

A

Intermedio

San Julián - Área 5 65

Área 3 62

Pozo del tigre - San José 60

San Julián - Área 5 120

Área 3 118

Pozo del tigre - San José 115

51%

DECUMBENTE

● Excelente

● Muy bueno

● Bueno

● Regular

● Malo

Verticilium

● Phoma

● Sclerotinia

● Alternaria

● Oídio

● Phomopsis

●

San Julián - Área 5

45.000 - 55.000

Área 3

45.000 - 50.000

Pozo del tigre - San José

40.000 - 45.000

SAN JULIÁN - ÁREA 5

ÁREA 3

POZO DEL TIGRE - SAN JOSÉ

MAR

ABR

B

MB

MA

A

Bajo < 1.000

Medio Bajo 1.000-1.500

Medio Alto 1.500-2.000

Alto > 2.000

● Tolerante

● Moderadamente tolerante

● Intermedio

● Moderadamente susceptible

● Susceptible

● Resistente

● Recomendado

● Medianamente recomendado

● No recomendado

✓

NS 1109 CL

● Zona óptima

● Zona de adaptación

Clearfield

B

MB

MA

A

Intermedio

San Julián - Área 5 63

Área 3 60

Pozo del tigre - San José 60

San Julián - Área 5 114

Área 3 115

Pozo del tigre - San José 114

53%

MUY DECUMBENTE

● Excelente

● Muy bueno

● Bueno

● Regular

● Malo

Verticilium

● Phoma

● Sclerotinia

● Alternaria

● Oídio

● Phomopsis

●

San Julián - Área 5

50.000 - 55.000

Área 3

45.000 - 50.000

Pozo del tigre - San José

45.000 - 50.000

SAN JULIÁN - ÁREA 5

ÁREA 3

POZO DEL TIGRE - SAN JOSÉ

MAR

ABR

B

MB

MA

A

Bajo < 1.000

Medio Bajo 1.000-1.500

Medio Alto 1.500-2.000

Alto > 2.000

● Tolerante

● Moderadamente tolerante

● Intermedio

● Moderadamente susceptible

● Susceptible

● Resistente



● Recomendado

● Medianamente recomendado


● No recomendado



CONSULTÁ CON NUESTRO EQUIPO COMERCIAL - INTERAGRO



Rolando Paz
76003280
☆ Gerente Comercial



Rogelio Cruz
75011632
☆ Sub Gerente Dpto. Semillas



Danne Quispe
78444609
☆ Ventas Semillas





Crecemos Juntos



Av. Virgen de Cotoca N° 2230. - Santa Cruz - Bolivia - Telf. +591-3-346-8282 - Fax +591-3-346-8283

WhatsApp: 760-05884 - Email: interagro@interagro-bo.com - Página web: www.interagro.com.bo

Sucursales: Of. San Pedro Telf.: 760-30434 - Of. 4 Cañadas Telf.: 965-6368 - Of. Tuna Telf.: 760-03167 - Of. Col. Pirai Telf.: 773-30627