

Catálogo semillas



Bienvenido al catálogo de productos



Accedé a todos los productos de nuestro portafolio de manera rápida y precisa, con la información justa para que encuentres el producto que mejor se adapta a tus necesidades.




MAÍZ⁰⁵
SOYA⁰⁶
GIRASOL⁰⁸



MAIZ



NS 70



● Zona óptima ● Zona de adaptación

Invierno Marzo a Mayo

Verano Octubre a Diciembre

Invierno 52.000 A 55.000

Verano 50.000 A 52.000



Convencional

152 - 135

Semi - dentado | Anaranjado

64

58

352

Helminthosporium ● Puccinia Polysora ● Espiroplasmosis ●
Geen Snap ● Quebrado ● Vuelco ●

210 - 120


B **MB** **MA** **A**
Bajo < 3.000 Medio Bajo 3.000-4.000 Medio Alto 4.000-6.000 Alto > 6.000

● Tolerante ● Moderadamente tolerante ● Intermedio
● Moderadamente susceptible ● Susceptible ● R Resistente

● Excelente ● Muy bueno ● Bueno
● Regular ● Malo



NS 82



● Zona óptima ● Zona de adaptación

Invierno Marzo a Abril

Verano
15 de septiembre a 15 de diciembre

Invierno 52.000 A 55.000

Verano 50.000 A 52.000



Convencional

143- 133

Semi - duro | Anaranjado

60

54

345

Helminthosporium ● Puccinia Polysora ● Espiroplasmosis ●
Geen Snap ● Quebrado ● Vuelco ●

220 - 130

B **MB** **MA** **A**
Bajo < 3.000 Medio Bajo 3.000-4.000 Medio Alto 4.000-6.000 Alto > 6.000

● Tolerante ● Moderadamente tolerante ● Intermedio
● Moderadamente susceptible ● Susceptible ● R Resistente

● Excelente ● Muy bueno ● Bueno
● Regular ● Malo

Siembra

Densidad
poblacional

Ambiente
recomendado

Tecnología

Días a madurez
de cosecha

Tipo de grano

Días a floración
50% antes

P 1.000 Granos
(gramos)

Perfil sanitario
y agronómico


Altura de planta
e inserción
de espiga (cm)

Posicionamiento
agronómico

SOYA



NS 7809 Magnífica



RR1


	NORTE	CENTRO	ESTE	SUR
BAJO				
MEDIO				
ALTO				

VII Largo

Indeterminado

Días a R1	34	Días a R8	112
Púrpura			
Gris			
180			
95			
Alto Medio Bajo			
Alto Medio Bajo			
Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo			

Cercospora Kikuchii Antracnosis
Phytophthora Sojae Mancha anillada




BAJO	<1.500	BAJO	<1.500
NORTE MEDIO	1.500-2.500	ESTE MEDIO	1.000-3.000
ALTO	>2.500	ALTO	>3.000
BAJO	<1.500	BAJO	<2.000
CENTRO MEDIO	1.500-3.000	SUR MEDIO	2.000-3.000
ALTO	>3.000	ALTO	>3.000

Recomendado Medianamente recomendado No recomendado
Tolerante Moderadamente tolerante Intermedio
Moderadamente susceptible Susceptible R Resistente



NS 8288 Rubí



RR1 STS


	NORTE	CENTRO	ESTE	SUR
BAJO				
MEDIO				
ALTO				

VIII Medio

Determinada

Días a R1	37	Días a R8	120
Púrpura			
Castaño			
200			
70			
Alto Medio Bajo			
Alto Medio Bajo			
Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo			

Cercospora Kikuchii Antracnosis
Phytophthora Sojae Mancha anillada



BAJO	<1.500	BAJO	<1.500
NORTE MEDIO	1.500-2.500	ESTE MEDIO	1.000-3.000
ALTO	>2.500	ALTO	>3.000
BAJO	<1.500	BAJO	<2.000
CENTRO MEDIO	1.500-3.000	SUR MEDIO	2.000-3.000
ALTO	>3.000	ALTO	>3.000

Recomendado Medianamente recomendado No recomendado
Tolerante Moderadamente tolerante Intermedio
Moderadamente susceptible Susceptible R Resistente

Tecnología

Ambiente
recomendado

Grupo
de madurez

Hábito
de crecimiento

Siembra

Color de flor

Pubescencia

P 1.000 Granos
(gramos)*

Altura (cm)*

Ramificación*

Porte

Comportamiento
a vuelco

Perfil sanitario
y agronómico


Épocas
de siembra
por zona

Posicionamiento
agronómico



NS 7901

Fortaleza



RR1

	NORTE	CENTRO	ESTE	SUR
BAJO				
MEDIO	○			
ALTO	○	○	○	

VII Largo

Indeterminada

Días a R1	38	Días a R8	120
Blanca			
Castaño			
140			
100			
● Alto ● Medio ● Bajo			
● Alto ● Medio ● Bajo			
● Excelente ● Muy bueno ○ Bueno ● Regular ● Malo			


	NORTE	CENTRO	ESTE	SUR
NOV	■	■	■	
DIC	■	■	■	■
ENE	■	■	■	■

NORTE	BAJO	<1.500	ESTE	BAJO	<1.500
	MEDIO	1.500-2.500		MEDIO	1.000-3.000
	ALTO	>2.500		ALTO	>3.000
CENTRO	BAJO	<1.500	SUR	BAJO	<2.000
	MEDIO	1.500-3.000		MEDIO	2.000-3.000
	ALTO	>3.000		ALTO	>3.000

● Recomendado ● Medianamente recomendado ● No recomendado
● Tolerante ● Moderadamente tolerante ● Intermedio
● Moderadamente susceptible ● Susceptible R Resistente



NA 8015



RR1

	NORTE	CENTRO	ESTE	SUR
BAJO	○			
MEDIO	○	○	○	
ALTO	○	○	○	

VIII Corto

Indeterminado

Días a R1	42	Días a R8	125
Blanca			
Castaño			
160			
110			
● Alto ● Medio ● Bajo			
● Alto ● Medio ● Bajo			
○ Excelente ● Muy bueno ● Bueno ● Regular ● Malo			

	NORTE	CENTRO	ESTE	SUR
NOV	■	■	■	
DIC	■	■	■	■
ENE	■	■	■	■

NORTE	BAJO	<1.500	ESTE	BAJO	<1.500
	MEDIO	1.500-2.500		MEDIO	1.000-3.000
	ALTO	>2.500		ALTO	>3.000
CENTRO	BAJO	<1.500	SUR	BAJO	<2.000
	MEDIO	1.500-3.000		MEDIO	2.000-3.000
	ALTO	>3.000		ALTO	>3.000

● Recomendado ● Medianamente recomendado ● No recomendado
● Tolerante ● Moderadamente tolerante ● Intermedio
● Moderadamente susceptible ● Susceptible R Resistente

Tecnología

Ambiente
recomendado

Grupo
de madurez

Hábito
de crecimiento

Siembra

Color de flor

Pubescencia

P 1.000 Granos
(gramos)*

Altura (cm)*

Ramificación*

Porte

Comportamiento
a vuelco

Perfil sanitario
y agronómico


Épocas
de siembra
por zona

Posicionamiento
agronómico

GIRASOL



PARAÍSO 1600



● Zona óptima
● Zona de adaptación

Clearfield Plus



Intermedio

San Julián - Área 5 65 | Área 3 62 | Pozo del tigre - San José 60

San Julián - Área 5 120 | Área 3 118 | Pozo del tigre - San José 115

51%

DECUMBENTE



● Excelente ● Muy bueno ● Bueno ● Regular ● Malo

Verticillium ● Phoma ● Sclerotinia ●
Alternaria ● Oidio ● Phomopsis ●

San Julián - Área 5 45.000 - 55.000 | Área 3 45.000 - 50.000 | Pozo del tigre - San José 40.000 - 45.000




B MB MA A
Bajo < 1.000 Medio Bajo 1.000-1.500 Medio Alto 1.500-2.000 Alto > 2.000

● Tolerante ● Moderadamente tolerante ● Intermedio
● Moderadamente susceptible ● Susceptible R Resistente
● Recomendado ● Medianamente recomendado ● No recomendado



NS 1109



● Zona óptima
● Zona de adaptación

Clearfield



Intermedio

San Julián - Área 5 63 | Área 3 64 | Pozo del tigre - San José 61

San Julián - Área 5 114 | Área 3 115 | Pozo del tigre - San José 114

53%

MUY DECUMBENTE



● Excelente ● Muy bueno ● Bueno ● Regular ● Malo

Verticillium ● Phoma ● Sclerotinia ●
Alternaria ● Oidio ● Phomopsis ●

San Julián - Área 5 50.000 - 55.000 | Área 3 45.000 - 50.000 | Pozo del tigre - San José 45.000 - 50.000



B MB MA A
Bajo < 1.000 Medio Bajo 1.000-1.500 Medio Alto 1.500-2.000 Alto > 2.000

● Tolerante ● Moderadamente tolerante ● Intermedio
● Moderadamente susceptible ● Susceptible R Resistente
● Recomendado ● Medianamente recomendado ● No recomendado

Tecnología

Ambiente
recomendado

Ciclo

Días de floración

Días a madurez
fisiológica

% de aceite

Capítulo

Comportamiento
frente a Vuelco
de raíz

Perfil sanitario

Población
recomendada

Épocas
de siembra
por zona

Posicionamiento
agronómico





Catálogo semillas

NIDERA
SEMILLAS







Crecemos Juntos



Av. Virgen de Cotoca N° 2230. - Santa Cruz - Bolivia - Telf. +591-3-346-8282 - Fax +591-3-346-8283

WhatsApp: 760-05884 - Email: interagro@interagro-bo.com - Página web: www.interagro.com.bo

Sucursales: Of. San Pedro Telf.: 760-30434 - Of. 4 Cañadas Telf.: 965-6368 - Of. Tuna Telf.: 760-03167 - Of. Col. Pirai Telf.: 773-30627